

## コミナティ予防接種の薬液調整・充填等準備

<目的> 予防接種のためのワクチン薬液の準備を行う

<物品> 不織布マスク、非滅菌手袋、手指衛生関連物品（擦式アルコール手指消毒剤）、注射器、使い捨て注射針、耐貫通性医療用廃棄容器、消毒用消毒綿、トレー

### コミナティ薬液調整・充填等準備の手順

- ① マスクを着用する
- ② 手指衛生を行い、清潔な非滅菌手袋を着用する
- ③ 薬剤名(コミナティ)を確認し室温に戻しておく。
- ④ コミナティ1バイアルに生食1.8mLを注入して希釈。
- ⑤ 白色の均一な液になるまでゆっくりと10回転倒混和。  
(希釈後に微粒子が認められる場合は使用しない)
- ⑥ 注射器に1回分(0.3mL)を吸い取り、針はそのままリキャップする。(針刺し事故に注意)
  - ※ 複数のワクチン接種準備をする場合は、繰り返す
  - ※ 手袋交換は必要ないが汚染した可能性がある場合は交換する
- ⑦ 最後に手袋を外し、手指衛生を行う

※ 薬液吸い上げを実施する場所は、可能な限り清潔な環境（空気の流れを考慮し、出入口などは避けるなど）で行うこと

※ コミナティ希釈後保存の際には、直射日光及び紫外線が当たらないようにし、室内照明による曝露を最小限に抑える。

- 参考) 1. 一般社団法人職業感染制御研究会予防接種手筋肉注射技における個人防護具の使い方 初版  
[http://jrgoicp.umin.ac.jp/ppewg/im/ppeguide\\_imvaccine\\_v1.pdf](http://jrgoicp.umin.ac.jp/ppewg/im/ppeguide_imvaccine_v1.pdf)  
2. コミナティ適正使用ガイド <https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/適正使用ガイド.pdf>  
3. 厚労省「ワクチンを安全に接種するための注意とポイント」 - YouTube  
<https://www.youtube.com/watch?v=rcEVMi2OtCY>

