

改訂一覧 2021.5.25

1) 5.25 医薬品・物品チェックリスト

改定前(5.24 版)

2021年5月24日 富士市医師会予防接種検討委員会

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場での
医薬品・物品チェックリスト
(接種後観察担当 Nrs がチェックする)

2021年 月 日

薬品・物品名	最低配置数	開始時	終了時	補充数
アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」(1ml) ※テブラで「0.3ml 使用」の表示	5			
アタラックス-P 注射液(25mg/ml) 1ml	5			
ミダフレッサ静注 0.1% 10ml	5			
ホリゾン注射液 10mg	5			
ソル・コーテフ静注用 500mg	3			

改訂後(5.25 版)

2021年5月25日 富士市医師会予防接種検討委員会

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場での
医薬品・物品チェックリスト
(接種後観察担当 Nrs がチェックする)

2021年 月 日

薬品・物品名	最低配置数	開始時	終了時	補充数
アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」(1ml) ※テブラで「0.3ml 使用」の表示	5			
アタラックス-P 注射液(25mg/ml) 1ml	5			
ミダフレッサ静注 0.1% 10ml	5			
ホリゾン注射液 10mg	5			
ソル・コーテフ静注用 500mg または 100mg	5			

2) 5.25 マニュアル⑧ 配置薬剤の使用目安

改定前(5.24 版)

2. ミダフレッサ静注 0.1% (1V=10mL=10mg)

適応：痙攣・てんかん発作

使用法：0.2mg/Kg (50Kg で 1V) を 1 分以上かけて静注

2'. ホリゾン注射液 10mg (1A=2mL=10mg)

適応：痙攣・てんかん発作時

使用法：1A を筋肉内、または静脈内にできるだけ緩徐に注射。

※呼吸抑制に注意。救急車同伴が望ましい。

改訂後(5.25 版)

2. ミダフレッサ静注 0.1% (1V=10mL=10mg)

適応：痙攣・てんかん発作

使用法：0.2mg/Kg (50Kg で 1V) を 1 分以上かけて静注

※呼吸抑制に注意。(アンビューバッグ用意)

2'. ホリゾン注射液 10mg (1A=2mL=10mg)

適応：痙攣・てんかん発作時

使用法：1A を筋肉内、または静脈内にできるだけ緩徐に注射。

※呼吸抑制に注意。(アンビューバッグ用意)